


イオウ (S) の量 (mg)
= 硫酸バリウム ($BaSO_4$) の量 (mg) × 0.13739

貯 法 容 器 密閉容器.

イオタラム酸

Iotalamic Acid



$C_{11}H_9I_3N_2O_4$: 613.91

3-Acetylaminoo-2,4,6-triiodo-5-(methylaminocarbonyl)-benzoic acid [2276-90-6]

本品を乾燥したものは定量するとき、イオタラム酸 ($C_{11}H_9I_3N_2O_4$) 99.0 % 以上を含む。

性 状 本品は白色の粉末で、においはない。

本品はエタノール (95) に溶けにくく、水に極めて溶けにくく、ジエチルエーテルにほとんど溶けない。

本品は水酸化ナトリウム試液に溶ける。

本品は光によって徐々に着色する。

確認試験

(1) 本品 0.1 g を直火で加熱するとき、紫色のガスを発生する。

(2) 本品を乾燥し、赤外吸収スペクトル測定法の臭化カリウム錠剤法により試験を行い、本品のスペクトルと本品の参考スペクトルを比較するとき、両者のスペクトルは同一波数のところに同様の強度の吸収を認める。

純度試験

(1) 溶状 本品 2.0 g を水酸化ナトリウム試液 10 mL に溶かすとき、液は無色透明である。

(2) 芳香族第一アミン 本品 0.50 g をとり、水 15 mL を加え、氷冷しながら水酸化ナトリウム試液 1 mL を加えて溶かし、亜硝酸ナトリウム溶液 (1 → 100) 4 mL を加え、直ちに 1 mol/L 塩酸試液 12 mL を加えて穏やかに振り混ぜる。正確に 2 分間放置した後、アミド硫酸アンモニウム試液 8 mL を加え、5 分間しばしば振り混ぜる。次に 1-ナフトールのエタノール (95) 溶液 (1 → 10) 3 滴を加えて 1 分間放置し、pH 10.7 のアンモニア・塩化アンモニウム緩衝液 3.5 mL を加え、混和した後、直ちに水を加えて正確に 50 mL とする。この液につき、同様に操作して得た空試験液を対照とし、紫外可視吸光度測定法により 20 分以内に試験を行うとき、波長 485 nm における吸光度は 0.25 以下である。

(3) 可溶性ハロゲン化物 本品 0.5 g を薄めたアンモニア試液 (1 → 40) 20 mL に溶かし、希硝酸 6 mL を加えて振り混ぜ、5 分間放置した後、ろ過し、ろ液をネスラー管にとる。残留物を水 20 mL で洗い、ろ液及び洗液を合わせ、これに水を加えて 50 mL とする。これを検液とし、以下塩

化物試験法を準用する。比較液は 0.01 mol/L 塩酸 0.10 mL に薄めたアンモニア試液 (1 → 40) 20 mL、希硝酸 6 mL 及び水を加えて 50 mL とする。

(4) ヨウ素 本品 0.20 g を水酸化ナトリウム試液 2.0 mL に溶かし、0.5 mol/L 硫酸試液 2.5 mL を加え、時々振り混ぜながら 10 分間放置した後、クロロホルム 5 mL を加えてよく振り混ぜ、放置するとき、クロロホルム層は無色である。

(5) 重金属 本品 1.0 g をとり、第 2 法により操作し、試験を行う。比較液には鉛標準液 2.0 mL を加える (20 ppm 以下)。

(6) ヒ素 本品 0.6 g をとり、第 3 法により検液を調製し、装置 B を用いる方法により試験を行う (3.3 ppm 以下)。

乾燥減量 0.5 % 以下 (1 g, 105 °C, 4 時間)。

強熱残分 0.10 % 以下 (1 g)。

定 量 法 本品を乾燥し、その約 0.4 g を精密に量り、けん化フラスコに入れ、水酸化ナトリウム試液 40 mL に溶かし、亜鉛粉末 1 g を加え、還流冷却器を付けて 30 分間煮沸し、冷後、ろ過する。フラスコ及びろ紙を水 50 mL で洗い、洗液は先のろ液に合わせる。この液に酢酸 (100) 5 mL を加え、0.1 mol/L 硝酸銀液で滴定する (指示薬: テトラブロモフェノールフタレンインエチルエステル試液 1 mL)。ただし、滴定の終点は沈殿の黄色が緑色に変わるとする。

0.1 mol/L 硝酸銀液 1 mL = 20.464 mg $C_{11}H_9I_3N_2O_4$

貯 法

保存条件 遮光して保存する。

容 器 気密容器。

イオタラム酸ナトリウム注射液

Sodium Iotalamate Injection

本品は水性の注射剤で、定量するとき、表示量の 95 ~ 105 % に対応するイオタラム酸 ($C_{11}H_9I_3N_2O_4$: 613.91) を含む。

製 法

(1)

イオタラム酸	645 g
水酸化ナトリウム	42 g
注射用水	適 量
全 量	1000 mL

(2)

イオタラム酸	772.5 g
水酸化ナトリウム	50.5 g
注射用水	適 量
全 量	1000 mL

以上 (1) 又は (2) をとり、注射剤の製法により製する。

性 状 本品は無色～微黄色透明の液で、わずかに粘性がある。

本品は光によって徐々に着色する。